CRITERIOS GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition)

El diagnóstico requiere la presencia de al menos 1 criterio fenotípico y 1 etiológico.

Grado severidad malnutrición	Criterios fenotípicos		
	Pérdida de peso	**BMI**	**Disminución de la SMM**
Fase 1: Malnutrición moderada	5-10% en últimos 6 meses; 10-20% más allá de 6 meses	<20 si <70 años y <22 si>70 años	Déficit moderado a severo*
Fase 2: Malnutrición severa	>10% en últimos 6 meses >20% más allá de 6 meses	<18,5 si <70 años y <20 si>70 años	Déficit severo

***Mediante técnicas de composición corporal validadas indicadas en el Consenso ESPEN (1)**

Tabla 1: Clasificación de la DRM, según criterios fenotípicos, en dos subtipos según los umbrales del grado de severidad de malnutrición: aguda o severa.

Grado severidad malnutrición	Criterios etiológicos	
	Disminución de la ingesta y/o asimilación	**Inflamación**
Fase 1: Malnutrición moderada	≤50% Requerimientos Energéticos >1 semana o cualquier reducción >2 semanas o presencia de enfermedad GI que afecta absorción y/o asimilación	Enfermedad crónica con inflamación
Fase 2: Malnutrición severa		Enfermedad crónica con una inflamación mínima o sin inflamación percibida Enfermedad o lesión aguda con una inflamación severa

Tabla 2: Clasificación de la DRM, según criterios etiológicos, en dos subtipos según los umbrales del grado de severidad de malnutrición: aguda o severa.

Bibliografía

(1) Cederholm T, Jensen GL, Correia MIT, Gonzalez MC, Fukushima R, Higashiguchi T, et al. ESPEN Endorsed Recommendation GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. A consensus report from the global clinical nutrition community. Clin Nutr 2019;38:1-9.